

***Caluromys lanatus* (Illiger, 1815)**

Micuré de oreja negra, chucha rata, chucha real roja, marta, marteja, ratón de agua, rajaco, marminero, chupacafé, chucha lanosa, maricotea.

Western Woolly Opossum.

[Lamina 1]

**Descripción:**



Coloración dorsal variada entre un pardo claro rojizo, pardo canela encendido o pardo pálido amarillento, generalmente más oscuro hacia el lomo y la grupa, flancos y extremidades más pálidos que el dorso. Pelaje largo, suave, denso y lanoso. Cabeza gris clara, con una línea dorsal oscura que se extiende hasta el rinario, con un anillo ocular muy difuso pardo canela, que se extiende anteriormente, ojos grandes. Orejas grandes, desnudas, pardas canelas oscuras a violáceas y externamente peludas hacia la base. Manos y patas rojizas o grises oscuras. Cola muy larga, peluda dorsalmente y ventralmente hasta la mitad, parda clara rojiza; la punta desnuda blanquecina moteada y con manchas pardas desde la base ventral. Vientre variado entre blanco amarillento a crema, con tintes grisáceos hacia el medio o pardo grisáceo claro.

**Hábitat:**

Habitan los bosques siempre verdes y submontanos, no son frecuentes en zonas intervenidas y secundarias, se observan en zonas de cafeteras.



**Ecología:**

Nocturnos arbóreos, solitarios, frugívoros e insectívoros; en algunas ocasiones consumen néctar. Se refugian en el día en huecos de arboles en lugares altos.

<b>CITES Apéndice</b>	<b>Distribución:</b>	
	Región Andina, Caribe, Amazonia y Orinoquia, valle del Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, de 0 hasta los 2000 m.s.n.m.	
<b>IUCN</b> <b>LR/lc</b>		



Taxonomía	
Orden	Didelphiomorpha
Familia	Didelphidae
Especie	<i>Caluromys lanatus</i>



Tamaño natural

10 mm


Formula dentaria			
I	C	P	M
5/4	1/1	3/3	4/4



p 5.0 x 2.8 cm






m 4.0 x 2.3 cm



Medidas (mm)			
LT	C	LP	O
217 - 298	330 - 435	39 - 50	31 - 41

### Especies similares

- *Caluromys philander*. (micuré).
- *Micoureus demerarae*. (micuré falso de la Guayana).



***Chironectes minimus* (Zimmermann, 1780)**

Chucha de agua, ratón de agua, runcho de agua, zarigüeya de agua.

Water Opossum.

[Lamina 1]

**Descripción:**



Dorso gris-pardo con una franja negra angosta desde el dorso hasta el comienzo de la cola, dilatándose esta en la escápula y prolongándose hasta las extremidades anteriores, espalda y grupa. Cabeza con el rostro largo y puntiagudo de color marrón oscuro, con manchas grises a los lados de la frente, barbilla y área alrededor de la boca casi desnuda; mejillas blancas, ojos medianos; vibras largas. Orejas cortas y redondeadas, grises oscuras. Vientre incluyendo garganta y labio inferior blanco o crema se extiende hasta las partes internas de las extremidades. Manos con dedos alargados provistos de almohadillas ásperas y uñas fuertes, patas muy grandes, con dedos alargados provistas de una membrana interdigital que nace en la parte superior de los dedos extendiéndose por todos estos. Cola larga, gruesa, desnuda y escamosa, negruzca con la punta blanca. Ambos sexos poseen bolsa marsupial.

**Hábitat:**

Vive en sitios cercanos a fuentes de agua como ríos y quebradas. Habitante propio de zonas áridas.


**Ecología:**

De hábitos nocturnos, terrestres y semiacuáticos; solitario o parejas. Se alimenta de peces, crustáceos, invertebrados y pequeños vertebrados; en ocasiones consume frutas.


<b>CITES Apéndice</b>	<b>Distribución:</b>	
	Todo el país en bosques húmedos higrotropofíticos, de 0 hasta los 2000 m.s.n.m aproximadamente.	
<b>IUCN</b>		
<b>LR/nt</b>		



Taxonomía	
Orden	Didelphiomorpha
Familia	Didelphidae
Especie	<i>Chironectes minimus</i>




20 mm



Tamaño natural




Formula dentaria			
I	C	P	M
5/4	1/1	2/3	4/4



Medidas (mm)			
LT	C	LP	O
260 - 298	327 - 420	60 - 74	25 - 32

**Especies similares**

- *Philander* sp. (chucha).
- *Metachirus nudicaudatus* (chucha mantequera).



***Metachirus nudicaudatus* (Geoffroy, 1803)**

**Chucha mantequera, cuica, chucha real roja, ratón fara, ratón tunato, tunata.**

**Brown Four-eyed Opossum.**

**[Lamina 1]**

**Descripción:**



Coloración dorsal pardo canela, siendo más oscura hacia la línea media dorsal, desde el lomo hasta la grupa; flancos y extremidades ligeramente más claros que el dorso. Pelaje corto, denso y medianamente suave. Cabeza más oscura que el cuerpo y con una mancha grande amarilla pálida sobre cada ojo y en la base de las orejas, el rostro con una línea media casi negra; ojos medianos, rinario desnudo y rosado. Orejas desnudas y pardas negruzcas. Manos y patas muy alargadas y con los dedos dilatados. Cola desnuda desde cerca de la base, enteramente parda o gris, o gradualmente palideciendo hacia la grupa. Vientre y garganta más claros que los costados, variando de color de un blanco crema a amarillento o anaranjado pálido. Los machos poseen escrotos rosados y las hembras con ocho pezones.

**Hábitat:**

De bosques densos o a lo largo de los márgenes de los ríos, caños y quebradas, en pantanos y suelos anegadizos; no están presentes en ecosistemas muy intervenidos.


**Ecología:**

Nocturnos, terrestres y ocasionalmente arbóreos; solitarios; se alimentan de pequeños vertebrados e invertebrados, frutas y semillas que caen al suelo. Se refugia de día en los árboles cerca al suelo y bien escondidos.




<b>CITES Apéndice</b>	<b>Distribución:</b>	
	Todo el país en zonas húmedas, de 0 hasta los 1500 m.s.n.m.	
<b>IUCN</b>		
<b>DD</b>		



Taxonomía	
Orden	Didelphiomorpha
Familia	Didelphidae
Especie	<i>Metachirus nudicaudatus</i>



Especies similares
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Chironectes minimus</i> (chucha de agua).</li> <li>• <i>Philander</i> spp. (chucha).</li> </ul>



***Didelphis marsupialis* Linnaeus, 1758**

Chucha, oposum, rabipelada, zariguella, chucha de orejas negras, comadreja overa, zorro hediondo, fero, fara runcho.

Common Opossum.

[Lamina 1]

**Descripción:**



Dorso de pelaje denso, negro o gris jaspeado de amarillo o blanco rucio; flancos más claros que el dorso, pelaje con dos capas de pelos largos y gruesos negros o grisáceos. Cabeza blanca rucia o crema amarillenta, con una débil franja oscura que se extiende desde la frente hasta el nivel de los ojos y a veces hasta el rinario; rostro con coloración similar a la cabeza, rinario despigmentado o rosado; vibrisas largas y gruesas. Los extremos de las patas y los costados de la cabeza son negros, el hocico más pálido que el resto del cuerpo y presentando manchas amarillentas. Las orejas son desnudas, grandes, redondeadas y totalmente negras. Cola del mismo largo que la longitud de la cabeza y el cuerpo, prensil con la punta totalmente desnuda, de color negro en su mitad proximal y el resto blanquecina. Vientre de color similar al dorso. Las hembras poseen bolsa ventral o marsupio poco desarrollado y abierto centralmente.

**Hábitat:**

Grietas de las rocas, troncos huecos y en árboles, a veces también en cielo raso de las casas. Propia de tierras bajas y de mediana elevación.

**Ecología:**

Semiarborícola de hábitos nocturnos y crepusculares, solitaria, omnívoros; busca su alimento en el suelo, frutos, invertebrados y pequeños vertebrados.

<b>CITES Apéndice</b>	<b>Distribución:</b>	
	Todo el país en los diferentes tipos de bosque, de 0 hasta los 2000 m.s.n.m.	
IUCN <b>DD</b>	<i>Didelphis marsupialis</i>	



Taxonomía	
Orden	Didelphiomorphia
Familia	Didelphidae
Especie	<i>Didelphis marsupialis</i>




10 mm



Tamaño natural

Formula dentaria			
I	C	P	M
5/4	1/1	3/3	4/4




p 3.5 x 6.0 cm

10 mm



m 3.5 x 5.0 cm



8 - 20 cm

19 cm






565 - 1610 g

Medidas (mm)				
LT	C	LP	O	CR
616 - 775	12 - 32	107 - 103	43 - 56	27 - 32

### Especies similares

- *Philander* sp. (chucha).
- *Didelphis albiventris* (chucha).



**Tamandua mexicana (Saussure, 1860)**

**Oso hormiguero centroamericano, oso colmenero, zorro hormiguero, oso hormiguero, zorro susurebe o susurete, oso amarillo.**

**Northen Tamandua, Collared Anteater.**

**[Lamina 2]**

**Descripción:**



Dorso con una línea amarillenta dorada que lo cubre en toda su extensión, pecho y flancos de color café obscuro prolongándose hasta la base del cuello formando una línea, que atraviesa la región escapular; estas líneas no se juntan a lo largo del dorso (formando un chaleco). Pelaje denso, corto, algo rígido y lustroso. Lados del rostro desde los párpados, hasta la trompa y los labios gris claro. Orejas medianas, redondeadas y pardas, oscuras. Manos con cuatro dedos presentando el segundo y tercer dedo una garra falciforme; patas con cinco dedos provistos de garras pequeñas. Cola larga, prensil y cubierta de pelos en la parte basal superior; la parte desnuda con manchas oscuras irregulares. Vientre de coloración negra similar a los flancos. En otros individuos de esta especie, el color obscuro está enmascarado por un tono amarillento rucio, desapareciendo el chaleco.

**Hábitat:**

Bosques de mediana elevación, bosques secos, secundarios, abiertos y húmedos, se refugian en troncos huecos y cuevas terrestres.

**Ecología:**

Arborícola, solitario, activo durante el día y la noche; insectívoro, se alimenta de hormigas, termitas, abejas, además de la miel de éstas.


<b>CITES Apéndice</b>	<b>Distribución:</b>	
<b>III</b>	Región Pacífica, Andina y Caribe; Valle del Magdalena, cuenca del Catatumbo, laderas montañosas, de 0 hasta 1500 m.s.n.m.	
23/04/81		
<b>IUCN</b>		
<b>DD</b>		



Taxonomía	
Orden	Xenarthra
Familia	Myrmecophagidae
Especie	<i>Tamandua mexicana</i>



10 mm




Tamaño natural

Formula dentaria			
I	C	P	M
0/0	0/0	0/0	0/0



p 4.0 x 2.0 cm

10 mm



m 3.0 x 2.0 cm



38 cm

19 cm





3.5 - 8.4 Kg

Medidas (mm)			
LT	C	LP	O
535 - 880	400 - 590	87 - 105	47 - 60

**Especies similares**

- *Tamandua tetradactyla* (oso hormiguero amazónico).



***Dasypus novemcinctus* Linnaeus, 1758**

**Armadillo común, armadillo, jusa, caseteja, gurre, jerre-jerre.**  
**Nine-banded long-nose Armadillo. [Lamina 2]**

**Descripción:**



Cabeza esta cubierta por una placa de pequeños escudos poligonales, por encima del arco cigomatico; el hocico es largo y ligeramente levantado; orejas prominentes sin pelos y muy juntas. Dorsalmente con un escudo flexible, de origen dérmico, compuesto por una placa escapular formando dos placas, seguida de una serie de nueve anillos móviles en forma de cuña, de color pardo grisáceo claro u oscuro, terminando en una placa pélvica ligeramente móvil; la cola es larga y delgada, formada por anillos con tres bandas de placas. Pelaje ausente, pero con pelos gruesos dispersos en el vientre y garganta. Extremidades delanteras parcialmente cubiertas por placas y cuatro dedos bien desarrollados, pies cubiertos con placas y cinco dedos; partes inferiores desnudas, con filas transversales de placas.

**Hábitat:**

Se encuentran en bosques de niebla hasta los bosques de arbustos espinosos y sabanas, especialmente en tierra no pedregosa. Habitan en madrigueras.


**Ecología:**

De hábitos nocturnos pero ocasionalmente se les ve durante el día; solitarios, se alimentan de insectos, larvas, huevos, pequeños vertebrados, frutas, hongos, raíces, caracoles, babosas, lombrices, etc.

<b>CITES Apéndice</b>	<b>Distribución:</b>	
	Todo el país, selva de matorrales en sitios húmedos y semihúmedos de 0 hasta 3000 m.s.n.m.	
<b>IUCN</b> <b>DD</b>		




Taxonomía	
Orden	Xenarthra
Familia	Dasypodidae
Especie	<i>Dasyus novemcinctus</i>



Tamaño natural




Formula dentaria			
I	C	P	M
0/0	0/0	0/0	7-9/7-9



Medidas (mm)			
LT	C	LP	O
356 - 573	245 - 450	75 - 110	35 - 57

### Especies similares

- *Cabassous centralis* (armadillo coletrapo)
- *Dasyus kappleri* (armadillo coligrueso).
- *Dasyus septemcinctus* (armadillo de siete bandas).



***Cerdocyon thous* (Lineaus, 1766)**

**Zorro perruno, zorra baya, zorro perro, zorro lobo, perro sabanero, perro cenizo, zorro de monte.**

**Crab-eating Fox.**

**[Lamina 2]**

**Descripción:**



Color gris oscuro moteado con gris claro, compuesto por una mezcla de pelos blancos amarillentos y negros con un tono más negro a lo largo del lomo y la cola; flancos y partes externas de las extremidades de coloración similar al dorso, pero gradualmente se hacen más negras y pardas hacia las manos y patas. Cabeza parda amarillenta rojiza, en particular alrededor de las orejas las cuales son negruzcas basalmente, aveces con reborde amarillo e internamente cubiertas de pelos largos blancos; rostro cubierto de pelos cortos oscuros, excepto alrededor de los ojos que son amarillentos rojizos; patas, manos, rostro y mandíbula negros; ventralmente blanco grisáceo, tornándose amarillento rojizo hacia la parte interna de las extremidades y blanquecino hacia el cuello y la garganta.

**Hábitat:**

Sus hábitats son variados y van desde las sabanas hasta los bosques húmedos, prefiriendo los bosques de niebla y el páramo, áreas montañosas; se refugian en madrigueras.

**Ecología:**

De hábitos crepusculares y nocturnos, usualmente solo pero se puede encontrar en parejas. Se alimenta de pequeños vertebrados roedores, ranas y reptiles; también de insectos y frutos silvestres.

<b>CITES Apéndice</b>	<b>Distribución:</b>	
<p style="text-align: center;"><b>II</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;">11/06/92</p>	<p>Sabanas de la Orinoquia, Amazonia (?), Valle del Magdalena, Costa Atlántica, Norte de Santander, Valle del río Cauca y regiones montañosas hasta el subparamo, de 0 hasta los 3200 m.s.n.m.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>IUCN</b></p>	<p style="text-align: center;">■ <i>Cerdocyon thous</i></p>	
<p style="text-align: center;"><b>DD</b></p>		



Taxonomía	
Orden	Carnivora
Familia	Canidae
Especie	<i>Cerdocyon thous</i>




20 mm



Tamaño natural




Formula dentaria			
I	C	P	M
3/3	1/1	4/4	2/3



Medidas (mm)			
LT	C	LP	O
590 - 765	243 - 335	132 - 165	66 - 80

### Especies similares

- *Atelocynus microtis* (zorro ojizarco).
- *Speothos venaticus* (perrito venadero).



**Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758).**

Tigrillo, canaguaro, gato solo, manigordo, tigre podenco, tigre serranero, ocelote.

Ocelot.

[Lamina 2]

**Descripción:**



En el dorso el pelaje es usualmente suave y corto, de color amarillo mate a encendido, ocasionalmente con tintes anaranjados, con manchas y líneas irregulares de las cuales las más grandes pueden ser cuadrangulares, pardas muy oscuras, bordeadas de negro (con forma de rosetas abiertas); en el cuello estas se transforman en franjas anchas longitudinales. En los costados las manchas negras también suelen acomodarse alineadas diagonalmente. El pelo del cuello se inclina hacia adelante, formando frecuentemente dos remolinos en los hombros. La cabeza similar en coloración al dorso; rostro ligeramente convexo; ojos grandes y pardos amarillentos. Orejas medianas, redondeadas e internamente cubiertas de pelos largos blancos. Vientre blanco con manchas negras. La cola es claramente más corta que la pata trasera y tiene manchas oscuras que tienden a formar bandas en el extremo.

**Hábitat:**

Bosques de tierras bajas. Se guarece entre árboles caídos o entre raíces aéreas que forman madrigueras.


**Ecología:**

Terrestre de hábitos nocturnos y activo durante el día pero manteniéndose oculto, solitario; caza iguanas, roedores de pequeño y gran tamaño, conejos, aves, serpientes, pecaríes y peces.


<b>CITES Apéndice</b>	<b>Distribución:</b>	
<b>I</b> <hr/> 18/01/90	Todo el país, en bosques húmedos nublados, subxerofíticos de 0 hasta los 2400 m.s.n.m.	
<b>IUCN</b>		
<b>VU</b>		



Taxonomía	
Orden	Carnivora
Familia	Felidae
Especie	<i>Leopardus pardalis</i>




20 mm



Tamaño natural

Formula dentaria			
I	C	P	M
3/3	1/1	3/2	1/1



p 4.5 x 5.0 cm

10 mm




m 5.0 x 5.5 cm

20 - 25 cm

8 - 12 Kg

Medidas (mm)			
LT	C	LP	O
710 - 875	320 - 410	140 - 170	50 - 65

Especies similares
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Leopardus wiedii</i> (tigrillo peludo).</li> <li>• <i>Leopardus tigrinus</i> (tigrillo gallinero).</li> </ul>



**Leopardus wiedii (Schinz, 1821)**  
**Tigrillo peludo, margay, manigordo.**  
**Margay.**

[Lamina 3]

**Descripción:**



El dorso de coloración parda mate amarillenta a parda grisácea amarillenta, con manchas y franjas irregulares pardas oscuras bordeadas de negro (las manchas dominan sobre las franjas); cuello con franjas negras con los pelos dirigidos hacia adelante, formando un solo remolino en los hombros; en el cuerpo las manchas son numerosas, tienden a ser más bien pequeñas cerca de la línea media de la espalda. Cabeza similar en coloración al dorso con manchas negras irregulares y discontinuas; rostro con manchas blancas al rededor de los ojos, con el rinario oscuro, ojos grandes en proporción al tamaño de la cabeza y de color pardo. Orejas grandes, pardas y dirigidas hacia delante, internamente cubiertas de pelos largos. Manos y patas largas amarillentas y ambas del mismo tamaño. La cola es más larga que la pata trasera y tiene pelo denso, con muchas manchas oscuras y pocas bandas que se unen en el extremo, dándole a éste un color casi negro. Vientre blanco con manchas negras.

**Hábitat:**

Bosques de tierras bajas, se adaptan a hábitats perturbados por el hombre.



**Ecología:**

De hábitos nocturnos, solitarios, semiarborícola. Se alimenta de pequeños vertebrados en los árboles algunas veces insectos y frutos.

<b>CITES Apéndice</b>	<b>Distribución:</b>	
<b>I</b>	Todo el país incluyendo la Sierra nevada de Santa Marta en bosques hidrofíticos húmedos, de 0 hasta los 1800 m.s.n.m.	
18/01/90		
<b>IUCN</b> <b>VU</b>		




Taxonomía	
Orden	Carnivora
Familia	Felidae
Especie	<i>Leopardus wiedii</i>



Tamaño natural




Formula dentaria			
I	C	P	M
3/3	1/1	3/2	1/1



Medidas (mm)			
LT	C	LP	O
501 - 720	351 - 490	107 - 137	45 - 60

**Especies similares**

- *Leopardus pardalis* (canaguaro).
- *Leopardus tigrinus* (tigrillo gallinero).



***Herpailurus yagouarondi* (Lacépède, 1809)**

**Gato pardo, gato de monte, gato montes, zorro gato, jaguarundi, gato montuno.**

**Jaguarundi.**

**[Lamina 3]**

**Descripción:**



Coloración uniforme, grisácea, gris negruzca o pardo rojizo, sin manchas. El aspecto general de esta especie es alargado y esbelto. El pelaje es corto y un tanto áspero. Cabeza pequeña proporcionalmente a la de los otros felinos de coloración similar al dorso; rostro muy elevado y ligeramente más claro que la cabeza; ojos con pupilas circulares. Orejas poco prominentes, pequeñas, redondeadas y dirigidas hacia atrás. Manos y patas delgadas y pequeñas, algo angostas para ser un gato, de coloración similar al dorso. Cola redonda muy alargada, siendo tan larga como el cuerpo, de coloración similar al dorso y poco peluda. El vientre tiene un color similar al del dorso o en todo caso puede ser solamente un poco más claro. En algunos individuos se destacan pequeñas manchas blancas en el área lacrimonasal superior interna, lo mismo que a los lados de la nariz. Algunos juveniles presentan aspecto moteado y otros tienen un aspecto semejante al de los adultos.

**Hábitat:**

Habita en los bosques bajos, selvas y matorrales muy densos.

**Ecología:**

De hábitos diurnos y nocturnos, solitario o en parejas. Hábil cazador; sus presas son pequeños vertebrados como aves, roedores, anfibios y peces.


<b>CITES Apéndice</b>	<b>Distribución:</b>	
<p><b>II</b></p> <hr/> <p>22/10/87</p>	<p>Todo el país, en bosques higrotrofos húmedos, matorrales subxerofíticos, sabanas bosques nublados, de 0 hasta los 3200 m.s.n.m.</p>	
<p><b>IUCN</b></p> <p><b>DD</b></p>	<p> <i>Herpailurus yagouarondi</i></p>	



Taxonomía	
Orden	Carnivora
Familia	Felidae
Especie	<i>Herpailurus yagouarondi</i>




10 mm



Tamaño natural

Formula dentaria			
I	C	P	M
3/3	1/1	3/2	1/1



p 3.0 X 3.0 cm




10 mm

m 3.0 X 3.0 cm

20 cm

1.5 - 9 Kg

Medidas (mm)				
LT	C	LP	O	CR
505 - 645	330 - 690	120 - 152	25 - 40	350



***Puma concolor* (Linnaeus, 1771)**

**Puma, león, león de montaña, león colorado, león campa o camba.**

**Puma.**

**[Lamina 3]**

**Descripción:**



El pelaje es variable en longitud y textura, aunque normalmente corto y algo áspero; de color uniforme, de tonos amarillentos o rojizos oscuros. Parte superior color acanelado o leonado, usualmente más oscuro a lo largo del dorso y sobre la frente y el rostro. La garganta, región maxilar, área labial, mejillas, mentón, pecho, vientre y extremidades anteriores por dentro, son de color pardo claro o blanquecino cremoso. El frente de la boca, blanco sobre la que se implantan las vibrisas; rinario desnudo. Los lados del rostro, la parte trasera de las orejas y el extremo de la cola son oscuros. Orejas cortas, redondeadas, blancas por dentro y con reborde oscuro. La cola es larga de grosor parejo, a veces con anillos oscuros, representa cerca de un tercio de la longitud total del animal. En los juveniles se denotan bandas transversales oscuras en tres hileras longitudinales irregulares; estas manchas se pierden aproximadamente a los tres o cuatro meses de edad.

**Hábitat:**

Extendido en casi todos los hábitats. Habita en los bosques, pastizales y zonas arbustivas.



**Ecología:**

De hábitos nocturnos y diurnos, terrestre, solitario. Caza presas de gran tamaño como venados pero también puede consumir otros vertebrados como serpientes, lagartos y peces.

<b>CITES Apéndice</b>	<b>Distribución:</b>	
<p style="font-size: 2em;"><b>II</b></p>	<p>Todo el país, en bosques subxerofíticos, selvas húmedas y nubladas de todo el país hasta el páramo, de 0 hasta los 4100 m.s.n.m</p>	
<p>04/02/77</p>	<p> <i>Puma concolor</i></p>	
<b>IUCN</b>		
<p style="font-size: 2em;"><b>VU</b></p>		




Taxonomía	
Orden	Carnivora
Familia	Felidae
Especie	<i>Puma concolor</i>






Tamaño natural

Formula dentaria			
I	C	P	M
3/3	1/1	3/2	1/1



Medidas (mm)				
LT	C	LP	O	CR
860 - 1540	630 - 960	230 - 290	83 - 102	530 - 790



**Panthera onca (Linnaeus, 1758)**


**Jaguar mariposa, tigre, tigre mariposo, tigre real, tigre pintado, tigre serrano, tigre amapolo, tigre negro , pantera .**

Individuos melánicos.

**Jaguar.**

**[Lamina 3]**

**Descripción:**



La cabeza es grande y robusta, con las orejas redondeadas. Su Coloración es ocre-amarillenta, más o menos uniforme sobre la línea dorsal y más pálido hacia los lados de la cabeza, cuello, pecho, flancos, extremidades y vientre. El pelaje en sus flancos es amarillento, a veces con tonos anaranjados; tiene numerosas manchas oscuras en forma de rosetas, en cuyo centro claro suele haber una o dos manchas oscuras. Cabeza, lados, cuello y extremidades presenta manchas oscuras, pero no franjas. Labios, garganta, abdomen y vientre blancos, con manchas negras compactas; rinario desnudo. Cola redonda, gruesa adornada de manchas irregulares negras. (En una piel extendida alcanza normalmente la mitad de la espalda). Las extremidades anteriores son muy robustas y comparativamente cortas.

Se presentan casos de albinismo o melanismo, estas formas se presentan con coloraciones blancas o negras, respectivamente.

**Hábitat:**

Bosques sin intervenir.


**Ecología:**

De hábitos nocturnos y diurnos, terrestre, solitario.— Se alimentan de presas de gran tamaño.


<b>CITES Apéndice</b>	<b>Distribución:</b>	
<b>I</b>	Bosques higrotropofíticos húmedos y selvas nubladas, más común; de 0 hasta los 2000 m.s.n.m. pero puede subir a los 3200 m.s.n.m.	
01/07/75		
<b>IUCN</b>		
<b>LR/nt</b>		



Taxonomía	
Orden	Carnivora
Familia	Felidae
Especie	<i>Panthera onca</i>




20 mm



Tamaño natural

Formula dentaria			
I	C	P	M
5/4	1/1	3/3	4/4



p 9.5 X 9.0 cm




10 mm

m 10.0 X 9.0 cm

30 - 50 cm

31 - 158 kg

Medidas (mm)				
LT	C	LP	O	CR
1100 - 1850	44 - 56	22 - 25	64 - 88	64 - 76



***Mustela frenata* Linchtenstein, 1831**  
**Comadreja común, chucuro, comadreja.**  
**Long-tailed Weasel.**

[Lamina 4]

**Descripción:**



Coloración dorsal parda oscura uniforme a parda achocolatada. Pelaje corto, denso y lustroso. Cabeza de color más oscuro que el dorso, algunas veces con manchas blancas detrás de los ojos y la garganta; rostro muy corto, con el rinario desnudo y de color carnosos o muy oscuro; vibras largas que llegan hasta las orejas; orejas pequeñas, peludas y redondeadas, de coloración similar a la cabeza. Manos y patas cortas, pardas oscuras y menos intensas que el dorso, cola corta y muy peluda con la punta gris oscura a negra. Vientre contrastando fuertemente con el dorso, variando de un blanco amarillento a anaranjado claro que se extiende hasta el labio inferior; presentan en ocasiones una mancha clara en la garganta anaranjada o crema amarillenta.

**Hábitat:**

Bosques premontanos y otros hábitats tales como cercas vivas, y barrancos en zonas donde los bosques han sido perturbados. Se refugia en cuevas, madrigueras, huecos de raíces y rocas.

**Ecología:**

Diurno y nocturno, solitario, terrestre se alimenta de pequeños vertebrados incluyendo aves silvestres y de corral; pequeños roedores que anidan en el suelo, además de lagartos y ranas.


<b>CITES Apéndice</b>	<b>Distribución:</b>	
	Región Andina de las tres cordilleras, Sierra Nevada de Santa Marta, de 0 a aproximadamente los 3600 m.s.n.m,	
IUCN <b>DD</b>		



Taxonomía	
Orden	Carnivora
Familia	Mustelidae
Especie	<i>Mustela frenata</i>




10mm



Tamaño natural




Formúla dentaria			
I	C	P	M
3/3	1/1	2/3	1/2



Medidas (mm)			
LT	C	LP	O
215 - 320	115 - 207	35 - 55	10 - 20

**Especies similares**

- Mustela africana* (comadreja amazónica).



***Galictis vittata* (Schreber, 1776)**

**Hurón, mapuro, grison.**

Grison or Huron.

**[Lamina 4]**

**Descripción:**



Dorso jaspeado, gris oscuro o pálido, mezclado con pardo oscuro; puntas blancas, continuando así hasta los costados, la grupa y cola; cuerpo alargado, de pelaje corto, denso y algo áspero; piel gruesa. Cabeza muy alargada, con la frente de igual coloración que el dorso, seguida de una banda blanca que atraviesa la frente en forma de diadema, proyectándose inmediatamente delante de los ojos hasta debajo de las orejas, mejillas, lados del rostro y el cuello; ojos de tamaño medio; vibrisas cortas y escasas, negras; rinario desnudo y ancho negro. Orejas relativamente anchas, grandes y peludas, pero sin sobresalir de la línea media de la cabeza, cubiertas de pelos blancos. Manos y patas fuertes cubiertas de pelos largos y negros; garras cortas pero afiladas. Cola corta y aguzada, de una a tres veces más corta que la cabeza y el cuerpo, peluda. Vientre, cuello, garganta y barbilla negros con tenue muestra de blanco; región inguinal y base de la cola gris oscuro.

**Hábitat:**

Principalmente regiones cálido-húmedas, cerca de ríos y quebradas donde pueda nadar.


**Ecología:**

Terrestre de hábitos nocturnos y algunas veces diurnos en horas de la mañana, solitario o en parejas; su alimentación es basada en pequeños vertebrados incluyendo roedores, aves, reptiles, anfibios y peces.


<b>CITES Apéndice</b>	<b>Distribución:</b>	
<b>III</b>	Región Amazónica, Pacífica y Sabanas de la Orinoquia en bosques subxerofíticos y selvas húmedas de 0 hasta 1200 m.s.n.m.	
01/01/84		
<b>IUCN</b>		
<b>DD</b>		



Taxonomía	
Orden	Carnivora
Familia	Mustelidae
Especie	<i>Galictis vittata</i>




20 mm






Tamaño natural

Formula dentaria			
I	C	P	M
3/3	1/1	3/3	1/2



1.5 - 2 Kg

Medidas (mm)			
LT	C	LP	O
465 - 552	135 - 195	75 - 97	20 - 30



***Eira barbara* (Linnaeus, 1758)**

Taira, ulamá, comadreja, melero, zorro collarejo, mama, umba.

Tayra.

[Lamina 4]

**Descripción:**



Coloración dorsal pardo oscuro a negra incluyendo las extremidades y la cola; cuerpo alargado. Pelaje denso, corto y lustroso. Cabeza un tanto alargada y su color varía de grisáceo claro hasta leonado o enteramente negro, lo mismo que el cuello que contrasta con el dorso. Rostro mediano; ojos grandes, rinario desnudo y negro. Orejas pequeñas y redondeadas, sin sobresalir de la línea media de la cabeza; rostro, cara y área intermandibular, amarillo a negro-amarillo. Manos y patas fuertes, patas posteriores más largas que las manos, lo que hace que la grupa sea notablemente más elevada. Cola larga, pero más corta que la cabeza y el cuerpo, muy peluda y negra. Vientre pardo oscuro o completamente negro, con una mancha que forma un collar amarillo pálido a anaranjado en el pecho.

**Hábitat:**

Bosques húmedos y secos de tierras bajas, se adaptan a hábitats modificados. Se le encuentra en troncos huecos y madrigueras en tierra.


**Ecología:**

Activo de día y de noche, solitario; busca su alimento tanto en el suelo como en los árboles, se alimenta de frutas invertebrados y pequeños vertebrados; depredador activo, llega a cazar pequeños monos.


<b>CITES Apéndice</b>	<b>Distribución:</b>	
<b>III</b>	Todo el país, en bosques hidrofíticos, selvas húmedas y nubladas, en bosques, espinosos subxerofíticos, de 0 hasta aproximadamente los 3200 m.s.n.m.	
26/09/90		
<b>IUCN</b>		
<b>DD</b>		



Taxonomía	
Orden	Carnivora
Familia	Mustelidae
Especie	<i>Eira barbara</i>




20 mm






Tamaño natural

Formula dentaria			
I	C	P	M
3/3	1/1	3/3	1/2



2.7 - 7 Kg

Medidas (mm)			
LT	C	LP	O
559 - 712	365 - 460	90 - 123	30 - 42



***Conepatus semistriatus* (Buddaert, 1784)**  
**Mapurito, mapuro, mapurite, mofeta, zorrillo.**  
**Striped Hog-nosed Skunk.**

[Lamina 4]

**Descripción:**



Dorso con dos líneas paralelas blancas que se extiende desde los flancos y converge en la corona de la cabeza, entre las dos líneas blancas una franja de color pardo oscuro a negro. Pelaje áspero, denso y algo grueso. Cabeza ancha y baja dorsalmente con una banda amplia blanca que se divide posteriormente; rostro largo y cónico, con el rinario truncado, grueso y desnudo; ojos pequeños. Orejas cortas, redondeadas no protuidas encima de la corona, negras y con algunos pelos blancos sobre en la base. Ojos negros brillantes. Manos y patas largas y negras, dedos con garras alargadas y curvas. Cola espesa completamente blanca hasta la punta, aunque presenta pelos negros en la base, del mismo tamaño que la cabeza y el cuerpo, al andar la cola se mantiene erguida. Vientre similar al dorso, pardo oscuro a negruzco. Glándulas anales con fluidos para defensa. Geográficamente existe variación cromática.

**Hábitat:**

Amplio rango de hábitats, se adapta a ambientes perturbados y modificados como zonas de cultivo prefiriendo los pastizales y otras áreas de cultivo.

**Ecología:**

Nocturno, terrestre, solitario, se alimenta de invertebrados y pequeños vertebrados escarba para encontrar su alimento y ocasionalmente frutas.


<b>CITES Apéndice</b>	<b>Distribución:</b>	
	Región Andina, Pacífica, Caribe y Orinoquia (?), Costa norte en sitios secos, selvas húmedas y nubladas, de 0 Hasta los 3100 m.s.n.m. Cordillera Oriental y Central.	
IUCN <b>DD</b>	<i>Conepatus semistriatus</i>	



Taxonomía	
Orden	Carnivora
Familia	Mephitidae
Especie	<i>Conepatus semistriatus</i>




20 mm





Tamaño natural

Formula dentaria			
I	C	P	M
3/3	1/1	3/3	1/2



Medidas (mm)			
LT	C	LP	O
332 - 500	166 - 317	70 - 120	26 - 35



**Lontra longicaudis (Olfers, 1818)**

**Nutria, perro de agua.**

**Neotropical Otter.**

**[Lamina 4]**

**Descripción:**



Su pelaje es pardo oscuro brillante, a veces con una ligera entremezcla de pelos más claros; el pelaje tiene una capa profunda y densa, formada por pelos suaves y más cortos. Cabeza de coloración similar al dorso; rostro chato y ancho; rinario relativamente grande y no se proyecta de manera notoria hacia atrás en su parte central, pequeño y de color pardo oscuro o negruzco; ojos pequeños; vibrisas cortas. Orejas muy pequeñas y redondeadas. Manos y patas con los dedos provistos de membranas interdigitales que le permite nadar ágilmente. Cola más de tres veces la longitud de la pata trasera (a veces un poco más), muy gruesa en la base, musculosa y con la punta truncada. Vientre, labio superior, parte baja de las mejillas, garganta y barbilla blanco plateado amarillento.

**Hábitat:**

Ríos, quebradas prefiriendo corrientes rápidas y no lentas.



**Ecología:**

De hábitos nocturnos y diurnos, solitarios o hembras con crías. Se alimenta de peces y crustáceos y otros animales acuáticos, siempre dentro o cerca del agua.

<b>CITES Apéndice</b>	<b>Distribución:</b>	
<b>I</b>	En todo el país, en los grandes ríos desde 0 hasta los 2800 m.s.n.m.	
01/07/75		
<b>IUCN</b>		
<b>VU</b>		




Taxonomía	
Orden	Carnivora
Familia	Mustelidae
Especie	<i>Lontra longicaudis</i>



Tamaño natural

Formula dentaria			
I	C	P	M
3/3	1/1	4/3	1/2



p 6.5 X 7.0 cm

10 mm

m 7.0 X 7.0 cm




20 - 30 cm

5 - 14.7 Kg

Medidas (mm)			
LT	C	LP	O
532 - 809	360 - 570	80 - 130	19 - 23

**Especies similares**

- *Pteronura brasiliensis* (perro de agua).



***Procyon cancrivorus* (Cuvier, 1798)**

**Mapache norteño, manipelado, zorra patona, cangrejero(a), mapache, oso lavador, zorra cañera, patoja.**

**Crab-eating Raccon.**

**[Lamina 5]**

**Descripción:**



Dorso pardo negruzco a pardo grisáceo, siendo los pelos con las puntas negras y la base pardo rojiza a blanquecina. Flancos del mismo color que el dorso. Pelaje corto y rígido. Cabeza de coloración similar al dorso; rostro con una línea blancuzca seguida de un antifaz ancho y negro el cual atraviesa los ojos se extiende debajo de las orejas; lados del hocico y labio superior blancos. Orejas medianas, levantadas y dirigidas hacia delante; peludas, oscuras y con reborde blanco o blanquecino. Manos cortas y patas alargadas, de color pardo oscuro con terminaciones en amarillo con aspecto canoso y de apariencia desnuda, dedos largos y dilatados, terminados en garras. Cola mediana, aproximadamente la mitad de la longitud cabeza cuerpo, moderadamente peluda y con anillos blanco-amarillentos; la cola es dispuesta hacia abajo. Vientre más claro que el dorso, pardo amarillento a pardo rojizo, tornándose más cremoso o blanco sucio hacia la garganta y barbilla.

**Hábitat:**

Cerca a quebradas, lagos y zonas estuarinas de tierras bajas.

**Ecología:**

Nocturno, omnívoro, solitario, semiarborícola, se alimenta de invertebrados, anfibios, pequeños mamíferos, huevos de aves y frutas.


<b>CITES Apéndice</b>	<b>Distribución:</b>	
	Todo el país, en bosques subxerofíticos, húmedos, zonas pantanosas de 0 a 1500 m.s.n.m región Amazonia (?).	
<b>IUCN</b>		
<b>DD</b>		



Taxonomía	
Orden	Carnivora
Familia	Procyonidae
Especie	<i>Procyon cancrivorus</i>




20 mm



Tamaño natural

Formula dentaria			
I	C	P	M
3/3	1/1	4/4	2/2



p 8.0 x 5.5 cm

10 mm

m 5.0 x 5.5 cm

30-40 cm

16 cm






3.1 - 7.7 Kg

Medidas (mm)			
LT	C	LP	O
543 - 650	252 - 380	130 - 150	50 - 60

### Especies similares

- *Procyon lotor* (mapache manglero).




***Nasua narica* (Linnaeus, 1766)**

**Cusumbo norteño, cusumbo solo, mocososo, cusumbo, cusumbo solino, gato solo, coatí, susuma.**

Withe-nose Coati.

**[Lamina 5]**

**Descripción:**



Dorso café oscuro a pardo, con cierta entremezcla de grisáceo plateado en los hombros (particularmente en los machos adultos) a veces con tonos rojizos hacia el cuello, cuerpo robusto. Cabeza marrón; el rostro es largo con el hocico móvil; hocico y barbilla tienen con el extremo blanco; con una franja clara que se extiende por encima del ojo; cachetes con manchas claras; puede presentar áreas de pelo más oscuro en la cabeza; orejas pequeñas del mismo color que la cabeza y con reborde blanco. Cola tan larga como la longitud cabeza cuerpo, es ancha en la base y se adelgaza hacia el extremo, con pelo grueso pero no muy tupido, puede tener débiles indicaciones de anillos oscuros y claros. Manos del mismo color que los hombros, patas de color similar al dorso. Vientre café oscuro a blanco cuello y pecho blanquecinos.

Los machos son mucho más grandes que las hembras.

**Hábitat:**

Amplio rango de hábitats. Se encuentra durmiendo y anidando en árboles.

**Ecología:**

Activo durante el día, gregario, semiarborícola. Se alimenta en el suelo o los árboles; come frutas, pequeños vertebrados. A veces causa daños en cultivos agrícolas. Vive en grupos pequeños.


<b>CITES Apéndice</b>	<b>Distribución:</b>	
<b>III</b>	Región Andina y Pacífica, Sierra nevada de Santa Marta; piso térmico cálido y templado, de 0 hasta los 3200 m.s.n.m. En bosques higrofiticos húmedos, zonas áridas y selva húmeda.	
26/09/90	■ <i>Nasua narica</i>	
<b>IUCN</b>		
<b>DD</b>		



Taxonomía	
Orden	Carnivora
Familia	Procyonidae
Especie	<i>Nasua narica</i>




20 mm



Tamaño natural

Formula dentaria			
I	C	P	M
3/3	1/1	4/4	2/2



p 7.0 X 4.5 cm

10 mm

m 6.0 X 4.5 cm



44 cm



11 cm






3 - 7.2 kg

Medidas (mm)			
LT	C	LP	O
463 - 690	490 - 620	93 - 146	34 - 42

### Especies similares


- *Nasua nasua* (cusumbo sureño).
- *Nasuella olivacea* (coatí andino, Guache).



***Potos flavus* (Schreber, 1774)**  
**Perro de monte, marteja, cuche.**  
**Kinkajou.**

[Lamina 5]

**Descripción:**



Dorso pardo rojizo , pardo amarillento o pardo grisáceo ahumado (existe variación cromática); a menudo con una línea dorsal parda oscura que se extiende a lo largo del lomo. Pelaje corto y denso, de textura suave. Cabeza pardo rojiza a pardo negruzca, redondeada, cara plana, con rostro corto; de coloración similar a la cabeza; rinario desnudo, pardo; ojos grandes, redondos y bastante separados. Lengua muy larga y altamente extensible. Orejas pequeñas cubiertas de pelo, redondeadas, dispuestas de manera baja y muy lateralmente, de color pardo. Manos y patas de coloración similar al dorso, con cinco dedos con garras largas, curvas y afiladas. Cola ligeramente más larga que la longitud de la cabeza y cuerpo, prensil y robusta que actúa como quinto miembro, de coloración similar al dorso; la cola hacia la punta se hace más aguzada y se torna más oscura, . Vientre de coloración amarillenta a pardo anteado o anaranjado.

**Hábitat:**

Bosques en general poco intervenidos, plantaciones y bosques de galería; se refugian en oquedades de árboles


**Ecología:**

Arborícola, hábitos nocturnos, en parejas, omnívoros se alimentan de frutas, néctar, pequeños invertebrados y vertebrados.


<b>CITES Apéndice</b> <hr/> <b>III</b> <hr/> 26/09/90 <hr/> <b>IUCN</b> <hr/> <b>DD</b>	<b>Distribución:</b> Todo el país, piso térmico cálido, templado y frío; en bosques higrofiticos húmedos y selva húmeda. de 0 hasta los 3000 m.s.n.m.	
	Potos flavus	



Taxonomía	
Orden	Carnivora
Familia	Procyonidae
Especie	<i>Potos flavus</i>




20 mm






Tamaño natural

Formula dentaria			
I	C	P	M
3/3	1/1	3/3	2/2



Medidas (mm)			
LT	C	LP	O
390 - 547	400 - 570	70 - 108	30 - 55

Especies similares
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Bassaricyon</i> spp. (macoperro).</li> <li>• <i>Bassariscus sumichrasti</i> (olingo).</li> </ul>




**Tremarctos ornatus (Cuvier, 1825)**

Oso andino, oso, oso negro, oso de anteojos, oso careto, oso congo, oso anteojado, oso frontino, oso enjaquimado, oso real, oso piñuelo.

Andean bear.

[Lamina 6]

**Descripción:**



Coloración dorsal parda muy oscura a negra. Flancos y extremidades igualmente. Pelaje denso, desordenado, largo y medianamente suave. Cabeza muy ancha, de coloración similar al dorso; rostro más pardo y puede tener una tonalidad pardo amarillenta; corto y sobresaliente a la vez; se destacan unos anillos ocraceos-amarillentos o casi blancos que parten de la comisura del labio superior hacia los lagrimales y de allí hacia arriba de los ojos, a manera de cejas rodeando todo el ojo, pueden existir bandas claras a lo largo del labio inferior; rinario desnudo, pardo oscuro a negro, ojos pequeños. Orejas pequeñas, redondeadas y peludas. Cuerpo grueso, corto y pesado. Manos y patas grandes, anchas, con cojinetes gruesos y con cinco dedos libres, con garras largas y curvas. Cola muy corta y peluda. Vientre similar en coloración al dorso, puede tener una mancha en forma de "Y" invertida a los lados del cuello y garganta, irregular y de color blanco.

**Hábitat:**

Vive en bosques de niebla, distribuido en la cordillera de los Andes, propio de zonas altas.

**Ecología:**

De hábitos nocturnos y diurnos, solitario, terrestre y algunas veces arbóreo. Hábitos alimenticios herbívoros aunque incluye en ocasiones carne; se alimenta principalmente de bromelias, frutos, palma, bambú, musaceas (plátanos) y otros tipos de vegetación.


<b>CITES Apéndice</b>	<b>Distribución:</b>	
<b>I</b>	Región Andina, Serranía de la Macarena, Baudó y Darién, pie de monte Oriental de los Andes desde 2000 a los 4000 m.s.n.m. No se ha encontrado en la Sierra Nevada.	
01/07/75	■ <i>Tremarctos ornatus</i>	
<b>IUCN</b> <b>CR</b>		



Taxonomía	
Orden	Carnivora
Familia	Ursidae
Especie	<i>Tremarctos ornatus</i>




40 mm





Tamaño natural

Formula dentaria			
I	C	P	M
2 - 3/3	1/1	4/4	2/3



Medidas (mm)			
LT	C	LP	O
1120 - 2200	70 - 75	195	93




**Tapirus bairdii (Gill, 1865)**

**Danta centroamericana, anta, macho de monte, tapir de montaña.**

**Baird's Tapir.**

**[Lamina 6]**

**Descripción:**



Cuerpo, cabeza y patas, rojizo; pelo corto y tupido; piel gris, que no está cubierta, con crin de pelo oscuro que va desde las orejas hasta la cruz. Labio superior alargado, curvo hacia abajo, tomando forma de una probosis; frente despejada; orejas cafés con el borde superior blanco y en la base pequeñas manchas blancas; ojos pequeños, brillantes de tonalidad amarillo pálido; cola corta y truncada. Patas posteriores con tres dedos, patas delanteras con un cuarto dedo, siendo el cuarto mas pequeño. Región ventral café y rojizo en la espalda. Juveniles de coloración castaño-rojiza con bandas amarillas y blancas longitudinalmente con pequeñas manchas. Patas y tobillos con manchas más grandes, ventralmente blancos. Juveniles de más edad, negruzcos. Animales robustos de tamaño pequeño, con cuerpo cilíndrico, cuello grueso y muy convexo en la nuca.

**Hábitat:**

Vive en bosques densos de montaña.


**Ecología:**

Nocturno y diurno, usualmente solitario, pero se les puede encontrar en pequeños grupos familiares en áreas determinadas. Herbívoro netamente.



<b>CITES Apéndice</b>	<b>Distribución:</b>	
<b>I</b>	Región Pacífica, Urabá y Alto Sinú.	
01/07/75	De 0 hasta aproximadamente 1000 m s n m; aun no se ha reportado para el Choco.	
<b>IUCN</b>		
<b>CR</b>		



Taxonomía	
Orden	Perissodactyla
Familia	Tapiridae
Especie	<i>Tapirus bairdii</i>



Especies similares
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Tapirus terrestris</i> (danta común).</li> <li>• <i>Tapirus pinchaque</i> (danta conga).</li> </ul>



***Pecari tajacu* (Linnaeus, 1758)**

**Saíno, zahino, cerrillo, baquiro, puerco de monte, marrano de monte, tatabro, tatabra collareja.**

**Collared Peccary.**

**[Lamina 6]**

**Descripción:**



Coloración dorsal gris o negruzca jaspeada y con un collar de pelos crema o amarillo pálidos desde la espalda hasta los cachetes; sobre la nuca se destaca una crin larga negra, lomo y grupa con pelos largos eréctiles, los pelos son bicolorados con bandas blancas y negras o amarillas. Pelaje esparcido largo y tosco. Cabeza grande y alta, estrechándose abruptamente hacia el rostro; rinario, de color similar al dorso; rostro terminado en un hocico oscuro y rosado; ojos pequeños. Orejas pequeñas, semi triangulares y paradas, internamente cubiertos de pelos. Cola muy corta y poco visible. Manos y patas con dedos grandes centrales y dos dedos pequeños a los lados que no tocan el suelo, patas con dos dedos grandes y uno pequeño que no toca el suelo, completamente negras, cubiertas de pelo muy cortos. Vientre de color similar al dorso. Presentan una glándula olorosa a lo largo del, para demarcar su territorio.

**Hábitat:**

Bosques de tierras bajas, muestran adaptabilidad para vivir en una gran variedad de hábitat, desde matorral desértico hasta bosque lluvioso.

**Ecología:**

De hábitos gregarios (forman grupos o piaras de 20 individuos), diurnos; se alimentan de raíces tuberosas, partes suaves de las plantas, frutos de palma y otras frutas.

<b>CITES Apéndice</b>	<b>Distribución:</b>	
<p><b>II</b></p> <p>18/09/97</p>	<p>Todo el país, en matorrales subxerofíticos, bosques higrotrofos, selvas húmedas de 0 hasta 2000 m.s.n.m.</p>	
<p><b>IUCN</b></p> <p><b>LR/nt</b></p>	<p> <i>Pecari tajacu</i></p>	



Taxonomía	
Orden	Artiodactyla
Familia	Tayassuidae
Especie	<i>Pecari tajacu</i>




40 mm



Tamaño natural

Formula dentaria			
I	C	P	M
2/3	1/1	3/3	3/3






25 - 45 Kg

Medidas (mm)			
LT	C	LP	O
950 - 1100	28 - 56	210 - 230	80 - 90

### Especies similares

- *Tayassu pecari* (tatabra).



**Tayassu pecari (Link, 1795)**

Tatabra, puerco manao, puerco de monte, chácharo, cafuche, huangana.

White-lipped Pecary.

[Lamina 6]

**Descripción:**



Coloración dorsal negra o parda muy oscura, cerdoso, en general de aspecto uniforme, pero puede verse una escasa mezcla de blanco, debido a que la base del pelo es blanca, dando un contraste con el resto de su pelaje. Cabeza muy ancha, alta y gruesa, con crin de pelos largos; rostro alargado y terminando en un hocico negro; cachetes y labio inferior blancos o crema. Orejas pequeñas, puntiagudas y paradas. Patas y manos negras; con pelo corto aplicado. Cola muy corta. Vientre de color similar al dorso, pero algunas veces son blancos hasta la parte interna de las extremidades. Los juveniles y algunos adultos con pelaje rojizo.

**Hábitat:**

Bosques de tierras bajas. Vive en zonas de vegetación boscosa rala o densa media o alta, en el sotobosque abierto o intrincado, cerca de cursos de agua. Se adaptan a zonas perturbadas.

**Ecología:**

De hábitos diurnos solamente; gregarios se mueven en manadas de 50 a 300 individuos que los protege de los depredadores. Se alimentan de frutos de palma, frutas y algunos invertebrados.


<b>CITES Apéndice</b>	<b>Distribución:</b>	
<b>II</b>	Todo el país, en bosques hidrofiticos húmedo de 0 hasta 2000 m.s.n.m.	
22/10/87		
<b>IUCN</b>		
<b>VU</b>	Tayassu pecari	



Taxonomía	
Orden	Artiodactyla
Familia	Tayassuidae
Especie	<i>Tayassu pecari</i>



40 mm



Tamaño natural

Formula dentaria			
I	C	P	M
2/3	1/1	3/3	3/3



p 4.0 x 4.0 cm



m 4.5 x 5.0 cm

10 mm

20 - 25 cm






17 - 35 Kg

Medidas (mm)				
LT	C	LP	O	CR
800 - 980	25 - 45	170 - 200	70 - 90	300 - 500

### Especies similares

- *Pecari tajacu* (saíno).




**Mazama americana (Erxleben, 1777)**

**Venado colorado, soche colorado, soche, venado de monte, venado reinoso, matacan, locho.**

Red Brocket Deer.

[Lamina 7]

**Descripción:**



Coloración dorsal parda rojiza mate a parda rojiza encendida. Lomo y grupa más oscuros que los flancos. Pelaje muy corto, denso y lustroso; con los pelos de la nuca dirigidos hacia delante; la espalda tiene un aspecto ligeramente encorvado y la grupa es visiblemente más alta en comparación con los hombros. Cabeza parda grisácea, a veces muy oscura; cornamenta muy alargada (9 a 12 cm) y dirigida hacia atrás, presente únicamente en los machos; la frente presenta una coloración más o menos oscura y un mechón de pelos largos con los extremos oscuros, rostro sin manchas; rinario desnudo; ojos grandes. Orejas medianas y levantadas, externamente peludas e internamente desnudas y rosadas. Manos y patas del mismo color que el dorso o más oscuros, en su parte interna claras (blancas), pelo corto. Cola muy corta, parte inferior blanca. Vientre castaño pálido; parte interna de los muslos, garganta y parte de los cachetes blanquecinos

**Hábitat:**

Bosques húmedos de tierras bajas, bosques premontanos de altura. Prefieren la vegetación muy tupida, zonas pantanosas, riberas de los y plantaciones viejas.

**Ecología:**

De hábitos nocturnos y diurnos, solitarios. Se alimentan de frutas, brotes tiernos y flores caídas.


CITES Apéndice	<b>Distribución:</b>	
<b>III</b>	Todo el país, en bosques higrofiticos húmedos y selvas nubladas de 0 hasta los 2000 m.s.n.m. En la Sierra Nevada de Santa Marta aproximadamente hasta 4000 m.s.n.m.	
IUCN <b>LR/nt</b>		



Taxonomía	
Orden	Artiodactyla
Familia	Cervidae
Especie	<i>Mazama americana</i>



40 mm  
macho adulto



Tamaño natural

Formula dentaria			
I	C	P	M
0/3	0/0	3/3	3/3



40 - 50 cm



15 cm

10 mm

mp 3.5 x 3.0 cm

mp 3.5 x 2.5 cm





24 - 48 Kg

Medidas (mm)				
LT	C	LP	O	CR
1050 - 1440	120 - 150	313 - 340	84 - 106	670 - 800

### Especies similares

- *Mazama gouazoubira* (soche gris).
- *Odocoileus virginianus* (venado sabanero).




***Odocoileus virginianus* (Zimmermann, 1780)**

**Venado sabanero, venado de racimo, venado blanco, taruca, ciervo, venado carameludo, venado ramazón, venado cachiliso, venado grande, venado de cornamenta, venado coliblanco, cucampo.**

White tailed Deer.

[Lamina 7]

**Descripción:**



Color del dorso pardo claro a pardo grisáceo, con tintes rojizos. Flancos y partes externas de color similar al dorso o más pálido, la espalda tiene un aspecto recto cuando el animal levanta la cabeza. Pelaje muy corto, denso y grueso. Cabeza pardo grisáceo, con una mancha clara alrededor del rinario de color pardo muy obscuro a negro; ojos grandes y negros, bordeado de blanco. Orejas grandes, alargadas y móviles, externamente grisáceas e internamente cubiertas de pelos blancos. Cornamenta rugosa y con varias puntas con dos ramas en machos adultos, siendo la segunda anterior bífida, las hembras no poseen cornamenta; en juveniles se observa un abultamiento en donde más tarde aparecen los cuernos. Cola corta y peluda, similar al lomo y ventralmente con pelos blancos, Vientre blanco, parte interna de las extremidades y el cuello pardo grisáceo, garganta con una mancha blanca que se extiende bajo la mandíbula excepto por un área pardo obscura hacia el extremo del labio inferior o bajo la comisura de la boca; el mentón lo mismo que los labios.

**Hábitat:**

Bosques y sabanas, bosques secundarios.

**Ecología:**

De hábitos nocturnos y diurnos, solitarios. Herbívoros, comen cortezas retoños tiernos de plantas, frutos de palma y otros frutos.


<b>CITES Apéndice</b>	<b>Distribución:</b>	
<b>III</b>	Región Andina, Caribe, Orinoquia, Pacífica y Amazonia, en sabanas y bosques abiertos de la, planicies del Caribe desde Córdoba hasta la Guajira en Bosques higrofiticos y Manglares, de 0 hasta los 4000 m.s.n.m.	
<b>IUCN</b>		
<b>VU</b>		



Taxonomía	
Orden	Artiodactyla
Familia	Cervidae
Especie	<i>Odocoileus virginianus</i>




25 mm  
macho adulto



Tamaño natural



Formula dentaria			
I	C	P	M
0/3	0/0	3/3	3/3



Medidas (mm)			
LT	C	LP	O
1130 - 2260	130 - 140	350 - 380	110 - 130

### Especies similares

- *Mazama americana* (soche colorado).
- *Mazama gouazoubira* (soche gris, Venado rojo).



**Coendou prehensilis (Linnaeus, 1758)**

**Puerco espín común, erizo, puercoerizo, puerco espín.**

**Brazilian Porcupine.**

**[Lamina 7]**

**Descripción:**



Cuerpo robusto cubierto de espinas tricoloreadas, con una banda basal blanca o amarillenta, seguida de una banda media y muy ancha negruzca o pardo negruzca y terminando en la punta con una banda blanca o amarillenta, dándole al animal un aspecto canoso. Pelaje compuesto por pelos entremezclados con las espinas; las espinas son fuertes, cilíndricas y punzantes. Cabeza corta de coloración similar al dorso, rostro cubierto de espinas cortas que gradualmente desaparecen hacia el rinario; rinario prominente y achatado, despigmentado o pardo claro, ojos oscuros, vibrisas negras y dirigidas hacia delante. Orejas muy pequeñas y con espinas cortas en el borde externo. Manos y patas negruzcas, con garras bien desarrolladas. Cola robusta, prensil aproximadamente igual a la longitud cabeza y cuerpo, cubierta de espinas y de pelos espinosos, disminuyendo gradualmente en tamaño hacia la punta. Vientre con pelaje mezclado de pelos oscuros y de espinas claras o con las puntas oscuras.

**Hábitat:**

Habitan bosques sin intervenir y alterados, estableciéndose en zonas de cultivo donde pueden ocasionar algunos daños.

**Ecología:**

De hábitos nocturnos, solitarios excepto en la época de apareamiento. Se alimentan de frutas, flores, tallos y otras estructuras vegetales. Se defienden de sus depredadores, por medio de sus largas espinas, que por su condición penetrante puede producir daños locales.


<p><b>CITES Apéndice</b></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>	<p><b>Distribución:</b></p> <p>Región Amazónica, Pacífica, Orinoquia y Caribe, piso térmico cálido, hasta los 1500 m.s.n.m.</p>	
<p><b>IUCN</b></p> <p><b>DD</b></p>	<p> <i>Coendou prehensilis</i></p>	



Taxonomía	
Orden	Rodentia
Familia	Erethizontidae
Especie	<i>Coendou prehensilis</i>




10 mm



Tamaño natural



Formula dentaria			
I	C	P	M
1/1	0/0	1/1	3/3



Medidas (mm)			
LT	C	LP	O
444 - 560	330 - 578	80 - 95	40 - 61

### Especies similares

- *Coendou bicolor* (puerco espín bicolor).



***Hydrochaeris hydrochaeris* (Linnaeus, 1766)**

Chigüiro, cacó, chiguire, yulo, roncoso, Jesús, sús, capiguara, capibara, lancho, lanche, ponche, culopando, piropiro, tinajo ponche.

Capybara.

[Lamina 7]

**Descripción:**



Coloración dorsal parda oscura rojiza, parda clara amarillenta o gris amarillenta pálida. Flancos y extremidades ligeramente más claros que el dorso. Pelaje grueso, cerdoso y mediano, un tanto aplastado y lustroso, presencia de gran número de glándulas sudoríferas. Cabeza similar en coloración al dorso, muy ancha y alta; rostro largo y muy elevado, de forma subcuadrada; ojos relativamente pequeños; rinario pequeño, ancho y con fosas nasales ampliamente separadas; vibrisas cortas, poco numerosas y oscuras. Orejas pequeñas, redondeadas y paradas. Manos con cuatro dedos y patas con tres dedos, con los dígitos unidos con membranas moderadas, garras fuertes y gruesas, en forma de casco. Cola muy rudimentaria o vestigial. Vientre de coloración similar al dorso, pero más disperso y suave, teniendo tonalidades claras. Los genitales externos en ambos sexos escondidos por un saco anal.

**Hábitat:**

Lugares con vegetación abierta, como herbazales y sabanas, en las márgenes de los ríos y caños de zonas bajas y húmedas.

**Ecología:**

Diurnos y nocturnos. Terrestres y semiacuáticos; herbívoros pastoreadores.

<b>CITES Apéndice</b>	<b>Distribución:</b>	
<hr/> <hr/> <hr/>	Región Caribe y Orinoquia, piso térmico cálido de 0 – 500 m.s.n.m. en zonas bajas pantanosas y planadas, en el alto Cauca hasta los 1000 m.s.n.m.	
IUCN <b>DD</b>		



Taxonomía	
Orden	Rodentia
Familia	Hydrochaeridae
Especie	<i>Hydrochaeris hydrochaeris</i>




40 mm




Tamaño natural

Formula dentaria			
I	C	P	M
1/1	0/0	1/1	3/3




p 6.0 x 6.0 cm

20 mm




m 6.0 x 5.0 cm





60 cm

11 cm



35 - 65 kg

Medidas (mm)				
LT	C	LP	O	CR
1.070 - 1.340	10 - 12	220 - 250	60 - 70	500 - 620



**Sciurus granatensis Humboldt, 1811**

**Ardilla colorada, ardilla, arditá.**

**Red-tailed squirrel.**

**[Lamina 8]**

**Descripción:**



De coloración dorsal muy variable, predominando el pardo oliváceo jaspeado de amarillo o anaranjado; pelos ticoloreados, con la base negruzca o negra, seguida de una banda parda anaranjada, amarillenta o rojiza y las puntas amarillentas, anaranjadas o rojizas. Pelaje corto o medio, denso o suelto y suave. Cabeza de coloración ligeramente más clara que el dorso; rostro menos encendido que la cabeza y el dorso, siendo muy claro hacia el rinario; ojos con un anillo ocular estrecho de color crema amarillento a anaranjado. Orejas pequeñas, paradas y redondeadas, peludas externamente y desnudas internamente. Las partes exteriores de las extremidades son de tonos grisáceos obscuro o rojizo. Cola muy larga, como la cabeza y el cuerpo; peluda con la base de los pelos negros y las puntas amarillentas, anaranjadas o rojizas; el dorso de la cola es rojizo obscuro, la punta de la cola es negra. Vientre variable entre grisáceo muy claro y rojizo apagado. Las hembras poseen tres pares de mamas, dos abdominales y una inguinal.

**Hábitat:**

Vive en bosques primarios o intervenidos, tanto en territorios secos como húmedos, invadiendo sectores semiurbanos.


**Ecología:**

De hábitos diurnos, arbóreos muy activos, solitarios pero puede hallarse en asociación familiar o congregarse en grupos para alimentarse; comen frutos, flores, además puede consumir casualmente huevos y pichones de aves.


<b>CITES Apéndice</b>	<b>Distribución:</b>	
	Región Andina, Pacífica, Caribe y Pacífica, en zonas húmedas y semihúmedas de 0 hasta 3200 m.s.n.m.	
<p style="text-align: center;"><b>IUCN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DD</b></p>	<p style="text-align: center;">■ <i>Sciurus granatensis</i></p>	



Taxonomía	
Orden	Rodentia
Familia	Sciuridae
Especie	<i>Sciurus granatensis</i>



10 mm



Tamaño natural

Formula dentaria			
I	C	P	M
1/1	0/0	1/1	3/3



p 5.0 x 2.5 cm



m 4.0 x 2.5 cm



20 - 60 cm



10 - 15 cm






212 - 520 g

Medidas (mm)			
LT	C	LP	O
200 - 285	140 - 280	40 - 65	16 - 36

**Especies similares**

- *Microsciurus* sp (ardillita).
- *Sciurus* spp. (ardillas).



***Agouti paca* (Linnaeus, 1766).**

**Guagua, guagua venada, guagua legitima, guagua de castilla, guartinajo, borugo, tinajo, lapa, conejo, pintadillo.**

**Paca.**

**[Lamina 8]**

**Descripción:**



Coloración parda oscura a parda castaña, con tres o cuatro líneas o manchas blancas, semirredondas con bordes irregulares en los flancos, desde el cuello hasta la parte baja de la grupa; cuerpo robusto; la grupa es mucho más elevada que la cruz. Pelaje muy corto, tosco y plano. Cabeza ancha y elevada, de coloración similar al dorso; rostro escasamente peludo, pardo oscuro; su cráneo posee una placa cigomática abombada y rugosa que sirve de caja de resonancia, de allí que sus mejillas sean ensanchadas. Ojos grandes y pardos oscuros; rinario desnudo, pardo, con vibrisas largas y gruesas. Orejas cortas, anchas en la base y semipunteagudas en la punta, poco peludas y pardas claras. Manos y patas parda claras a pardas oscuras; las patas traseras son alargadas y tienen cinco dedos claramente diferenciados; los tres centrales son más grandes que los otros dos. Cola apenas visible, oculta entre el pelaje posterior a la grupa. Vientre blanco a crema sucio, incluido el pecho, garganta, cachetes y barbilla.

**Hábitat:**

Propias de zonas de bosques, cercas a fuentes de agua. Las madrigueras pueden ser cuevas excavadas por ellos, cavidades entre los barrancos o bancos cerca a quebradas llamadas "horganaleras".


**Ecología:**

Hábitos nocturnos, solitarios, poco sociables. Se alimentan de frutas, nueces, hojas, rizomas, tubérculos y semillas.


<b>CITES Apéndice</b>	<b>Distribución:</b>	
<b>III</b> 26/09/90	Todo el país, en selvas higrótropicas húmedas de 0 hasta los 2000 m.s.n.m.	
<b>IUCN</b>		
<b>LR/nt</b>	■ <i>Agouti paca</i>	



Taxonomía	
Orden	Rodentia
Familia	Agoutidae
Especie	<i>Agouti paca</i>




20 mm



Tamaño natural



Formula dentaria			
I	C	P	M
5/4	1/1	3/3	4/4



Medidas (mm)				
LT	C	LP	O	CR
616 - 775	12 - 32	107 - 103	43 - 56	27 - 32

**Especies similares**

- *Dinomys branickii* (guagua colona).
- *Agouti taczanowskii* (boruga de páramo).



***Dasyprocta punctata* Gray, 1842**

Ñeque, ñeque centroamericano, guatín, cuatín, conejo negro, patecera, conejo de monte, picure, bucua, caimo, chacure.

Central American Agouti.

[Lamina 8]

**Descripción:**



Coloración dorsal parda amarillenta pálida jaspeada de gris y parda leonada, con los pelos de la grupa negros con bandas blancas o amarillentas; el cuerpo no es robusto. Flancos y extremidades pardas leonadas amarillentas o anaranjada. Pelaje mediano, grueso y denso, con los pelos de la grupa largos y tiesos; la grupa es más elevada que los hombros. Cabeza de coloración similar al dorso, jaspeada; rostro más oscuro dorsalmente y más claro hacia los cachetes, con una mancha clara alrededor de los ojos; ojos medianos, vibras gruesas negras y largas, llegan hasta la base de las orejas. Orejas desnudas, pardas claras. Manos y patas pardas oscuras o negruzcas; las patas traseras son alargadas y sólo tres de sus dedos son claramente visibles; con garras robustas. Cola muy corta, poco visible, parda oscura. Vientre pardo amarillento, con pelos blancos o crema en la garganta, región inguinal y barbilla; los dos sexos poseen mamas, siendo las de los machos no funcionales. Existen variación cromática dentro de esta especie.

**Hábitat:**

Bosques primarios o secundarios, zonas de cultivos, econtrándose cerca a zonas de agua húmedos y secos de zonas bajas.

**Ecología:**

De hábitos diurnos y nocturnos; solitarios pero pueden formar grupos familiares; terrestres. Se alimentan de nueces de palma, raíces, frutos y semillas, almacenan comida en escondrijos.


<b>CITES Apéndice</b>	<b>Distribución:</b>	
<p style="text-align: center;"><b>III</b></p> <p style="text-align: center;">26/09/90</p>	<p>Región Andina, Pacífica y Caribe, Valle del Río Cauca, bajo y medio Magdalena, Norte de Santander, Región de Santa Marta, Isla Gorgona, de 0 hasta los 1600 m.s.n.m.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>IUCN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>LR/lc</b></p>	<p>■ <i>Dasyprocta punctata</i></p>	



Taxonomía	
Orden	Rodentia
Familia	Dasyproctidae
Especie	<i>Dasyprocta punctata</i>




20 mm



Tamaño natural

Formula dentaria			
I	C	P	M
1/1	0/0	1/1	3/3



p 4.5 X 3.5 cm

10 mm



m 3.0 X 2.5 cm



20 - 25 cm

6 cm





32 - 42 Kg

Medidas (mm)			
LT	C	LP	O
480 - 600	20 - 55	120 - 156	36 - 47

**Especies similares**

- *Dasyprocta fuliginosa* (ñeque amazónico).




***Sylvilagus brasiliensis* (Linnaeus, 1758)**  
**Conejo sabanero, conejo silvestre.**

Tapiti.

[Lamina 8]

**Descripción:**



Coloración dorsal parda muy oscura, pardo amarillento con fuerte mezcla de negro, especialmente a lo largo de la espalda; sobre la nuca se aprecia un conspicuo parche de pelos canela sin mezcla de negro. Pelaje denso. Cabeza similar al dorso; área nasal y coronilla con fuerte color ocre; rostro con manchas claras sobre los ojos. Orejas muy largas, peludas y móviles; en su parte exterior negras u ocre, con reborde blanco; área intramandibular y labios blancos; collar en la garganta muy ancho de color ocre. Manos pequeñas y oscuras; patas muy alargadas y fuertes, cubiertas de pelo, con tonos ocres y tonalidades de blanco. Cola muy corta, siendo ventralmente parda clara a anteada y café por encima. Vientre gris, pecho y abdomen gris. Enorme variación cromática relacionada con la distribución. Individuos de zonas de páramo predominan las coloraciones con tonos grises, las extremidades y la cara con coloraciones rojizas.

**Hábitat:**

Habitan zonas abiertas, cultivos y áreas cercanas a cuerpos de agua.

**Ecología:**

De hábitos nocturnos, terrestres, solitarios. Se alimentan de pastos y arbustos.

<b>CITES Apéndice</b>	<b>Distribución:</b>	
	Región Andina, Caribe, Pacífica y Orinoquia, en selvas húmedas, nubladas, páramo, Valle del Patía. Cañón del Chicamocha, de 0 hasta aproximadamente hasta los 4800 m.s.n.m.	
<b>IUCN</b>  <b>DD</b>		



Taxonomía	
Orden	Lagomorpha
Familia	Leporidae
Especie	<i>Sylvilagus brasiliensis</i>



10 mm



Tamaño natural

Formula dentaria			
I	C	P	M
2/1	0/0	3/2	3/3



p 4.0 x 2.0 cm



m 3.0 x 2.0 cm

10 mm

60 - 100 cm

15 - 35 cm

6.5 cm



450 - 1200 g

Medidas (mm)			
LT	C	LP	O
268 - 395	10 - 35	64 - 85	40 - 61

### Especies similares

- *Sylvilagus floridanus* (conejo sabanero).

